

Trauma und Meningokokkenmeningitis.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
einer Hohen medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexander-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Ludwig Himmler
aus Heidelberg.

Tag der mündlichen Prüfung: 18. März 1935.

Referent: Geheimrat Prof. Dr. G. Specht.
Dekan: Geheimrat Prof. Dr. Fr. Jamin.

Meinen lieben Eltern in Dankbarkeit gewidmet.

Die Frage über den Zusammenhang von Trauma und akuten Infektionskrankheiten, die früher ausschließlich wissenschaftliches Interesse erregte, hat in neuerer Zeit erhöhte Beachtung in Hinsicht auf die Unfallbegutachtung erfahren. Kein Wunder, daß die Beziehungen zwischen Verletzungen und inneren Krankheiten häufig der Gegenstand eingehender Erörterungen wurden. Bald haben sich dabei gewisse Gesichtspunkte ergeben, nach welchen das Trauma Bedeutung für das Zustandekommen oder die weitere Ausbreitung einer Infektion gewinnen kann. Stern teilt sie in drei Gruppen ein.

1. Verletzungen der Haut oder einer den Mikroorganismen zugänglichen Schleimhaut können den Infektionserregern eine Invasionsstätte verschaffen.

2. Das Trauma kann Infektionserregern, die vor- oder nachher in den Körper eingedrungen sind, die Lokalisation ermöglichen. Durch die Schädigung der Gewebszellen oder der Zirkulation wird im Blute kreisenden Keimen die Möglichkeit gegeben sich an den verletzten Stellen festzusetzen, sich zu vermehren und ihre pathogene Wirkung zu entfalten.

3. Ein Unfall kann auf einen schon vor der Verletzung infizierten Körperteil einwirken und dabei den Bakterienherd, der vorher keine objektiven Krankheitserrscheinungen ergeben hat, aktivieren.

Zu diesen drei Arten kommt neuerdings noch ein vierter, allerdings umstrittener Gesichtspunkt, dessen Annahme besonders durch gewisse Erfahrungen des Krieges gerechtfertigt schien, eine Zeit, die durch die überaus häufigen traumatischen Schädigungen wie keine andere zum Studium dieser Zusammenhänge geeignet war.

4. Ein Trauma soll unter Umständen imstande sein eine gewisse Krankheitsdisposition zu schaffen, ohne daß dabei

makroskopische oder auch mikroskopische Veränderung des Gewebes stattgefunden haben müssen. Der Grund wird in einer Schwächung der Widerstandskräfte des Körpers gesucht, die durch eine heftige Chokwirkung, sei es somatischer, sei es psychischer Art, herbeigeführt wird. Daß dabei natürlich das Zusammentreffen des körperlichen und des psychischen Moments eine erhöhte Krankheitsgefahr bedeuten würde, ist natürlich und verständlich.

Alle diese Voraussetzungen komplizieren manche Fälle sehr und es ist oft ungeheuer schwierig für eine gerechte Begutachtung den richtigen Weg zu finden.

Klare Verhältnisse treffen wir dort, wo durch eine Verletzung eine Wundinfektion mit einem für den Menschen jederzeit pathogenen Keim erfolgte. Als klassisches Beispiel sei hier die Tetanusinfektion genannt. Hier bildet tatsächlich das Trauma, wenn auch mittelbar, die Ursache der Erkrankung, da dieses allein die Infektion besorgte. Weitaus schwieriger sind aber die Fälle zu beurteilen, bei denen der Unfall überhaupt nicht Infektionsvermittler war, sondern ihm nur ein auslösendes Moment zuerkannt werden kann; denn es wird oft schwer oder nicht zu beweisen sein, daß nur dieses Trauma verantwortlich für die Entstehung der danach auftretenden inneren Krankheit gemacht werden kann, da doch diese unabhängig von irgend welchen äußeren Einflüssen, sehr häufig ebenso gut ihre eigene Bahn läuft.

Besondere Bedeutung gewinnt in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß manche Mikroorganismen, wie Streptokokken, Staphylokokken, Pneumokokken, Colibazillen und auch Meningokokken, in oder auf dem menschlichen Körper vorhanden sein können, ohne Krankheitsercheinungen auszulösen, dann aber durch irgendwelche Umstände veranlaßt, eine schwere Erkrankung bewirken.

Die Vorbedingungen für eine Erkrankung sind also in vielen Fällen vorhanden. Meist fehlt also nur noch eine auslösende Ursache. Da wir spezielle Momente hiefür noch nicht kennen, müssen wir zur Klärung solche mehr allgemeinen Charakters heranziehen. Es sind dies: Alter, Er-

müdung, Erkältung, Witterungseinflüsse, Unterernährung, Bevölkerungsdichte und das Trauma körperlicher und psychischer Art. Dem Kausalitätsbedürfnis des Menschen entsprechend, wird vom Laien gern dem Trauma, des in die Augen fallenden und nicht zu übersehenden Geschehnisses wegen, eine krankmachende Wirkung zuerkannt häufiger, als dies bei genauer Untersuchung der Fall gewesen sein kann.

Im vollen Gegensatz dazu hat sich die Wissenschaft in den früheren Jahren nur auf den exakten anatomischen Standpunkt gestellt. Neuerdings hat man einräumen müssen, daß es doch auch auf diesem Gebiet noch viele Dinge gibt, die wir mit unseren heutigen Methoden noch nicht erfassen können; außerdem ist man auf verschiedene Veröffentlichungen von Fällen hin, deren klinischer Zusammenhang verblüffend, deren anatomische Grundlage jedoch gleich null war, wieder viel vorsichtiger geworden. Nachdem man nunmehr in der Zellbiologie und dem kolloidalen Zellchemismus eine Brücke gefunden zu haben glaubt, über die ein solcher Zusammenhang möglich erscheint, haben sich auch einige Autoren deutlich für einen solchen ausgesprochen.

Sie gehen aber insofern zwei verschiedene Wege, als die einen sich mehr für die *an den Ort der Gewalteinwirkung gebundene* Beeinträchtigung der Immunität aussprechen, die anderen aber die Annahme einer *allgemeinen* Herabsetzung der Abwehrstoffe rechtfertigen zu können glauben. So erkennt Wassermann dem Trauma nur eine Schädigung der *lokalen* Immunitätsverhältnisse zu; für die Möglichkeit der Schwächung der *allgemeinen* Abwehrfähigkeit dagegen setzen sich Weichselbaum und Strümpell ein. Wenn im „Strümpell“ bei der Beschreibung der Pneumonie der Satz zu finden ist: daß ein Trauma, welches die Brust betraf, *allein* durch die Schädigung der allgemeinen Widerstandskräfte, das Zustandekommen einer Infektion erleichtern kann, so ist damit Weichselbaums Anschauung auf ein bestimmtes Organ bezogen: das Trauma kann als Faktor dienen, welches die bakteriziden Reaktionen des Organismus im ganzen abschwächt, wodurch Bedingungen für

die lokale Selbstinfektion geschaffen werden. Aronowitsch greift ebenfalls diese Theorie auf, erweitert sie aber insofern, als er die Forderung eines Ortszusammenhanges zwischen Trauma und Erkrankungsherd überhaupt fallen läßt.

Diese Unterscheidung von lokaler und allgemeiner Schädigung der Immunitätsverhältnisse ist für die daraus erwachsenden Folgerungen von höchster Bedeutung; denn bleibt einerseits der lokale Zusammenhang der beiden Ereignisse gewahrt, so wäre es andererseits z. B. denkbar, daß nach einem Kopftrauma eine Appendizitis, oder, wie im Falle Aronowitsch, nach einem Armtrauma eine Meningokokkenmeningitis auftritt.

Diesen Anschauungen gegenüber hält nun noch der größte Teil der Sachverständigen an der sinnlich greifbaren Auffassung fest, insbesondere sind es die Chirurgen, die der eben erörterten zellbiologischen Lehre mit dem größten Zweifel gegenübertreten und sie oft auch vollkommen ablehnen. Deswegen wird man diese Lehre in vielen chirurgischen Abhandlungen, z. B. über Appendizitis und Osteomyelitis, vergeblich suchen. Dafür finden wir z. B. bei Rosenberg und Lücke die ganz extreme Ansicht für die Osteomyelitis vertreten, daß diese als eine spezifische Infektionskrankheit aufzufassen sei. Diese Ansicht ist sicherlich zu weit gehend; im allgemeinen wird die Möglichkeit eines Zusammenhangs auf sichtbarer anatomischer Basis zugegeben.

Ähnliche Gesichtspunkte treffen wir auch bei der Meningitis wieder. Wenn im folgenden unter den Meningitiden verschiedener Genese nur auf die durch Meningokokken bedingte Entzündung näher eingegangen werden wird, dann aus diesem Grunde, weil die Beurteilung des Zusammenhangs zwischen Trauma und Infektion zwar im großen und ganzen eine allgemeine Besprechung zuläßt, im speziellen aber weitgehend auf die besonderen Faktoren Rücksicht zu nehmen hat. Ein Eingehen aber auf sämtliche traumatisch bedingten Hirnhautaffektionen würde zu weit führen. Als ein solcher wichtiger Faktor aber ist der spezifische Erreger der Meningokokkenmeningitis zu betrachten.

Um der allgemeinen Orientierung willen sei hier die

Einteilung der Meningitiden wiedergegeben, die Huguenin in folgender übersichtlicher Weise gegliedert hat.

1. Meningitis nach *Commotio cerebri* ohne jegliche Verletzung.

2. Meningitis nach Verletzungen der Weichteile des Schädels.

3. Meningitis nach perforierenden Verletzungen.

4. Meningitis nach Otitis der Schädelkappe.

5. Meningitis nach perforierenden Verletzungen, welche mit Blutextravasaten verbunden sind.

6. Meningitis im Stadium der Knochennekrose.

Die folgenden Erörterungen werden sich hauptsächlich mit den beiden ersten Gruppen zu befassen haben; der Zusammenhang liegt bei den übrigen klar am Tage. In der Literatur sind darüber zahlreiche einschlägige Fälle beschrieben worden.

Da das Zustandekommen einer Meningokokkenmeningitis natürlich das Vorhandensein von Meningokokken voraussetzt, ist es nötig zunächst diese Quelle zu eruieren. Meningokokken sind wenig widerstandsfähig und zum Wachstum außerhalb des menschlichen Körpers nicht befähigt. Sie gehen daher in der Außenwelt rasch zugrunde. Eine Infektion durch Nahrungsmittel und Kleidung kommt also nicht in Frage; ebenso sind Tiere von denen die Infektion ausgeht, auszuschließen, da wir keine kennen, die den Meningokokkus beherbergen. So bleibt uns also nur der Schluß, daß der Mensch selbst Meningokokkenträger ist. Tatsächlich hat sich nun im Nasenrachenraum des Menschen ein Ort gefunden, wo der Meningokokkus gewissermaßen ubiquitär ist; dafür liegen in der Literatur mehrere eingehende Beobachtungen vor. So widerspruchsvoll sie zum Teil in Einzelheiten sind, so kann man doch im allgemeinen sagen, daß es sich bei dem Meningokokkus um einen verhältnismäßig harmlosen Schmarotzer handelt. Er kann in vielen Punkten mit dem Pneumokokkus verglichen werden, der auch nur zu gewissen Zeiten für den Menschen pathogen wird. Um also die spezifisch Infektionskrankheit auslösen zu können, setzt der Infektionserreger unbedingt noch andere Beding-

ungen voraus. Man kann dabei an zweierlei Möglichkeiten denken.

1. *Begünstigung der Ansiedlung an einer bestimmten Stelle.*

2. *Verschiebung des Verhältnisses zwischen Pathogenität der Bakterien und der Abwehrkraft des Körpers zu Ungunsten des Körpers:*

a) im Sinne einer Virulenzsteigerung, diese ist allerdings mit Vorsicht zu bewerten,

b) im Sinne einer Immunitätsabschwächung.

Für die Erkrankung eines Individuums sind beide genannten Bedingungen, abhängig oder unabhängig von einander, nötig; oder anders ausgedrückt: ein Faktor allein wird keine Erkrankung hervorrufen können.

Die Bedeutung die ein *Trauma* nun für das Zustandekommen einer Infektion — im speziellen einer Meningokokkeninfektion — gewinnen kann, wird ebenfalls zunächst auf einer Erfüllung der beiden oben genannten Forderungen beruhen. Dies braucht aber nicht unbedingt der Fall zu sein, dann nämlich, wenn schon von vorne herein durch andere Geschehnisse bereits einer der beiden Punkte vorhanden war. Beispielsweise wäre folgender Fall denkbar: Eine Person wurde durch eine schwere Krankheit in ihrer Widerstandsfähigkeit sehr stark geschwächt, sie hat sich davon noch nicht erholt. In diesem Zeitpunkt schafft nun ein Trauma dem Erreger eine bestimmte Ansiedlungsmöglichkeit; eine Erkrankung ist die Folge. Dem Trauma kommt also hier nur die Begünstigung der Ansiedlung zu, trotzdem war aber das Trauma schuld an der Erkrankung.

Auf ähnliche Fälle wird wohl auch die Stelle im Unfallgesetz zu beziehen sein, wo der Nachweis gefordert wird, „daß die bei dem Unfall erlittenen Verletzung eine von mehreren zur Krankheit führenden Ursachen ist und als solche ins Gewicht fällt“.

Auf die Behauptung, daß ein Faktor allein nicht zur Erkrankung genüge, soll noch kurz näher eingegangen werden.

So braucht die Begünstigung der Ansiedlung an einer

bestimmten Stelle nicht unbedingt von einer Entzündung gefolgt zu sein. Oft werden kleinste mechanische Defekte, chemisch bedingte Reizzustände, Zirkulationsstörungen als Erkältungsfolge die Widerstandsfähigkeit der Schleimhaut herabsetzen können und so häufig den Zugang der Bakterien zur Lymphe oder dem Blut erleichtern. Die im Körper vorhandenen Schutzstoffe überwältigen wohl meist in kürzester Zeit den Eindringling, der gar nicht die genügende Kampfkraft besitzt, um die Sperrkette der Immunkörper zu durchbrechen. Ähnliches sagt v. Bergmann: Es ist nicht notwendig, daß die in den Körper eingeschleppten Mikroorganismen die Eiterung auch wirklich hervorrufen und die Vorgänge einer Entzündung auslösen. Es ist also nicht von der Hand zu weisen, daß dann und wann einmal Bakterien ins Körperinnere bez. sogar ins Blut gelangen ohne Krankheits Symptome zu erzeugen. Fälle im Experiment, wo trotz intravenöser Injektion von pathogenen Mikroorganismen keinerlei Wirkung eintrat, bestätigen eine solche Annahme.

Wie nun einerseits die Begünstigung der Ansiedlung an einer bestimmten Stelle und, als deren Voraussetzung, die Invasion nicht genügt, so wird auch andererseits der zweite Punkt (Verschiebung des Verhältnisses zwischen Pathogenität der Bakterien und der Abwehrkraft des Körpers zu Ungunsten des Körpers) allein ebenfalls nicht zur Erkrankung führen können, wenn die Keime, so auch die Meningokokken, kein Einfallstor finden; es sei denn, daß die Erreger infolge ihrer Virulenz aktiv genug sind die Schranke zwischen Außenwelt u. Lymphe bzw. Blut von sich aus zu überwinden. In diesen Zusammenhang sei an die *Spirochäta pallida* erinnert, die nur bei Gewebsdefekten, wenn auch kleinster Art, eine Infektion bewerkstelligen kann. Ähnlichen Bedingungen scheint auch der Meningokokkus zu unterliegen. Zu Zeiten, in denen die Krankheit ein gehäuftes Auftreten zeigt, werden doch von den kranken Individuen unzählige voll virulente Keime in die Außenwelt gebracht, wobei die Zahl der Kokkenträger stark in die Höhe geht; trotzdem zeigt sich, daß Leute, die in ständiger

Berührung mit den Kranken kommen, keineswegs sehr viel häufiger erkranken als andere Personen. Außer der Rolle, welche unbekannte Momente dabei spielen, scheinen doch auch diese mechanischen Verhältnisse beachtet werden zu müssen. Die Keime bleiben eine kurze Zeit auf der Rachenschleimhaut liegen ohne eine Eintrittspforte in den Körper zu finden. Ob sie dabei vielleicht durch die örtlich vorhandenen Immunstoffe in ihrer Virulenz abgeschwächt werden und nun im Falle eines tatsächlichen Eindringens keine große Gefahr mehr bilden, sei dahingestellt.

Den ersten Punkt — Begünstigung der Ansiedlung an einer bestimmten Stelle — kann ein Unfall auf zweierlei Weise ermöglichen.

Der Meningokokkus muß durch das Trauma in das Innere des Körpers eindringen und somit die Möglichkeit haben sich von sich aus an einen seinen Lebensbedingungen zuträglichen Ort festzusetzen, oder er muß vorher, gleichzeitig mit dem Trauma oder nachher in den Körper eingedrungen, Bedingungen vorfinden, die geeignet sind ihn an bestimmten Stellen festzuhalten.

Eine Invasionsstätte für den Erreger kann jede gröbere oder feinere Verletzung der Nasen- und Rachenschleimhaut bilden. Bei Unfällen wird sich eine solche Verletzung durch Nasenbluten bemerkbar machen. Es besteht nun die Möglichkeit, daß die im Rhinopharynx vorhandenen Erreger durch eine solche Gewebstrennung in die Blutbahn gelangen. Ihnen ist somit die Möglichkeit gegeben, wenn auch über dem Umweg des Blutkreislaufes, an die Meningen zu kommen. Dort können sie, dank ihrer Affinität zu den weichen Hirnhäuten, Krankheitserscheinungen auslösen. Manche Autoren halten diese hämatogene Entstehung der Genickstarre, allerdings der genuinen, nahezu für die Regel. Zweifellos ist aber auch diese Infektionsart bei der traumatischen Entstehung zu berücksichtigen. Wohl begünstigt hier die Verletzung nicht die Ansiedlung an den Meningen unmittelbar, bietet aber doch mittelbar Gelegenheit die Hirnhäute anzugreifen.

Eine andere Möglichkeit ist die Verschleppung der

Weichselbaum'schen Kokken bei einer angenommenen Verletzung der Schleimhäute, auf dem Lymphwege vom Nasen-Rachenraum aus, dies um so mehr, als ja bekanntlich enge Lymphverbindungen zwischen dem Rachendach und dem Schädelinneren bestehen.

Endlich wäre noch der Fälle zu gedenken, bei denen, — immer wieder eine Verletzung der Nasenrachenschleimhaut vorausgesetzt, — die spezifische Entzündung der Hirnhäute durch direkte Fortleitung aus der Umgebung zwanglos erklärt werden kann. Vom Rhinopharynx ausgehend durchwandern die Erreger die Lamina cribrosa, treffen auf die Dura und erreichen schließlich nach Überwindung dieses Hindernisses ihr Ziel. Hat nun freilich eine Fissur oder Fraktur der Schädelbasis vorgelegen, dann tritt diesem direkten Fortschreiten kein Widerstand mehr entgegen, naturgemäß sind auch diese Fälle die gefährtesten.

Andere Möglichkeiten der Invasion, wie die genannten, die hämatogene, die lymphogene und die kontinuierliche, lassen sich schwerlich für den Meningokokkus noch angeben. Damit ist aber der Einfluß eines Insults auf eine Entzündung der weichen Hirnhäute noch lange nicht erschöpft; denn auch die Ansiedlung selbst an den Meningen kann das Trauma in entscheidender Weise beeinflussen. Voraussetzung ist dann natürlich, daß durch irgend welche anderen Zufälligkeiten Meningokokken schon in der Lymph- bzw. Blutbahn vorhanden waren.

Es liegt auf der Hand, daß dann Änderungen in der Zirkulation, wie Stase, Thromben, Blut- und Lymphextravasate für ein Haften der Keime viel beitragen werden. Doch nicht jede beliebige solchermaßen geschädigte Stelle gibt dem Meningokokkus gleich günstige Lebensbedingungen, da die Erkrankung fast nur an die weichen Hirnhäute gebunden ist. Daß es diese jedoch nicht allein zu sein brauchen, beweisen mehrere Fälle in der Literatur. Meningokokken fand v. Drigalski in Herbesbläschen, Stade in pneumonischen Herden und Schwaitz und v. Drigalski in deren Sputum. Weitere Beobachtungen von Meningokokken auf endokarditischen Auflagerungen stammen von Weichselbaum,

Ghon, Schottmüller und Lenhartz, im perikardialen und pleuritischen Exsudat von Bettencourt und Franca. Pick konnte sie im spermatocystischen Eiter und endlich Winterstein im Auge nachweisen. Ofters sind auch Roseolen bzw. Purpurafälle bei Meningokokkenmeningitis beschrieben worden, die eine Beteiligung des gesamten Kapillarnetzes annehmen lassen und damit die Krankheit in die Gruppe der Allgemeininfektionen einreihen. Ja es sind sogar einige Fälle mit Meningokokkenbakteriämie ohne Meningitis Symptome beschrieben worden.

Die Infektion befällt jedoch, wie gesagt, in den weitest häufigsten Fällen nur die Leptomeningen. Die Frage nach den Faktoren, die für bestimmte Krankheitsprozesse mit Vorliebe eine bestimmte Örtlichkeit auswählen, gehört zum Gesamtproblem von der örtlichen Vulnerabilität, über die Spielmeyer für das Zentralorgan eingehende Abhandlungen veröffentlicht hat. Eines ist sicher, daß es recht mannigfache ortsbestimmende Momente gibt, von denen heute nur wenige bekannt sind, sodaß das Wesen der Vulnerabilität mancher Prädilektionsstellen noch recht unklar erscheint. Als hauptsächliche und heute schon bekannte Faktoren nimmt Spielmeyer für das Zentralnervensystem den systematischen, den vasaalen und den durch Liquorveränderungen bedingten Typus an. Wahrscheinlich ist bei der Erkrankung der Hirnhäute dem systematischen Typus insofern der Vorzug zu geben, als die elektive Lokalisation mit den in den Geweben liegenden Ursachen zusammen hängt, die wohl physikochemischer Natur sein werden. Natürlich ist durch diese Umschreibung der Tatsachen mit Worten auch nicht viel gewonnen.

Für die Ausbreitung und die Lokalisation innerhalb der Meningen ist der dritte Typus der Vulnerabilität, der Liquor, von wesentlichem Einfluß. Untersuchungen von Spatz zeigen, daß bei Einführung von Noxen in den Liquor die Art der Ausbreitung mit den Veränderungen bei der basalen Meningitis übereinstimmt. Folgt also eine Infektion nicht diesen Gesichtspunkten, so sind wir berechtigt, das Abweichen in gewissen anderen Faktoren zu suchen. Unter

verschiedenen anderen kann auch einmal ein Trauma einen solchen Faktor darstellen. Spielmeyer selbst aber schreibt in einer Antwort auf persönliche Anfrage, ob eine Beeinflussung der Vulnerabilität durch leichtere Traumen geschehen könne: „Aus meinen Untersuchungen über die örtliche Vulnerabilität weiß ich keine Folgerungen und Schlüsse zu ziehen, die für die aufgeworfene Frage von Wert wären.“

Was den anderen Punkt — Verschiebung des Verhältnisses zwischen Pathogenität der Bakterien und den Abwehrkräften des Körpers zu Ungunsten des Körpers — betrifft, so könnte man hier ebenfalls an eine Begünstigung durch das Trauma denken. Die beiden Unterabteilungen dieses Punktes, nämlich die Steigerung der Virulenz einerseits und die Schwächung der Abwehrkräfte andererseits, getrennt zu besprechen, ist nicht möglich, denn wir können, nach von Angerer, vorerst leider die Virulenz des Erregers und die Resistenz des Menschen nicht unabhängig von einander definieren. Eine große Virulenz kann auch eine starke Resistenz durchbrechen, und gering virulente Keime können einen empfänglichen Menschen doch krank machen. So ist die Infektion stets eine Gleichung mit zwei Unbekannten! So muß also öfter die Frage offen gelassen werden, ob in dem einen oder anderen Falle mehr eine Virulenzsteigerung oder eine Schädigung der Immunkörper anzunehmen ist. Ein Einfluß aber auf diese Wechselbeziehungen ist sicher sehr häufig vorhanden.

Der alten Lehre vom „locus minoris resistentiæ“, die durch verschiedene bakteriologisch-experimentelle Untersuchungen bestätigt wurde, kommt dabei sicher die größte Bedeutung zu. Es ist kein Wunder, daß auf dem äußerst günstigen Nährboden, den nekrotisches, nekrobiotisches Gewebe, Thromben usw. schaffen, Bakterien infolge der mangelnden Gewebsvitalität und infolge Ausschaltung aus dem antikörperreichen Saftstrom des Organismus sich sehr rasch entwickeln. In diesem Zustand können sie nur mehr sehr schwer oder nicht mehr vom Körper vernichtet werden. Vorbedingung ist allerdings in diesem Falle, wo äußere Wunden nicht gesetzt wurden, jedoch aufgrund eines locus

minoris resistentiae eine Erkrankung eintrat, daß pathogene Mikroorganismen im Blute kreisen. Zu diesem Schluß kommt auch Ehrnroth nach seinen Untersuchungen.

Klar und ohne weiteres verständlich scheinen daher die Zusammenhänge zwischen Trauma und Infektion bei den mit gröberen anatomischen Zerstörungen einhergehenden Verletzungen, nicht so hingegen dort, wo keinerlei morphologische Strukturänderung nachzuweisen ist. Die Erklärung ist in einem Teil der Fälle dennoch in einer Änderung des Zellzusammenhangs zu suchen, wie uns mitunter das Mikroskop zu beweisen imstande ist. In den anderen Fällen läßt sich jedoch auch keine Gewebsalteration im histologischen Bilde feststellen; diese könnte man nur als funktionelle Störungen betrachten.

Man glaubt dem Trauma allein, ohne jede Verletzung innerer oder äußerer Art, eine gewisse Wirkung zuschreiben zu dürfen, die in der Lage wäre die Immunitätsverhältnisse des Körpers, entweder lokal oder allgemein empfindlich zu stören. So sollen besonders allgemeine Verletzungsfolgen, wie Chok, Collaps, Ohnmacht die allgemeine Widerstandskraft des Organismus stark beeinträchtigen. Außer der Annahme feinsten, auch nicht mehr mit dem Mikroskop nachweisbarer Gewebsveränderungen, könnten Änderungen des Zellinhalts im kolloidchemischen Sinne — wohl meist reversibler Art — zur Erklärung herangezogen werden.

Osmotischer Druck, Ionenwanderung, die Wirkung elektrischer Ladungen, die Kräfte der Oberflächenspannung, Quellung und Entquellung von Kolloiden begründen die chemisch-physikalische Organisation der Zelle. Sie lösen Stoffbildung und lebendige Bewegungen aus, welche der Assimilation und Dissimilation, dem Wachstum und den spezifischen Funktionen dienen. Alle Lebensvorgänge sind an den kolloidalen Zustand gebunden. (Nach Roefle).

Daß nun ein abnorm starker Reiz, wie es ein Trauma darstellt, eine Funktionsaufhebung bzw. Minderung der Zelle bedingen kann, ist verständlich und auch bei der reinen Commotio cerebri nicht ohne weiteres abzuleugnen.

Bei den engen Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten aber, welche zwischen allgemeiner biologischer Tätigkeit der Zelle und deren spezifischen Funktionen bestehen, läßt sich schließen, daß solange eine Minderung letzterer besteht, diese sicher auch mit einer Herabsetzung der andern vitalen Eigenschaften verbunden sein wird. Eine Veränderung der natürlichen Abwehrfähigkeit nach der negativen Seite hin würde also sozusagen einen „locus minoris resistentiae“ unsichtbarer Art darstellen. Die Versuche Ehrnrooths erhärten dies auch bis zu einem gewissen Grade. Er konnte zeigen, daß die intravenöse Injektion von Eitererregern bei Kaninchen sehr viel häufiger zu einer Meningitis führte, wenn die Versuchstiere, gleichzeitig mit der Infektion oder höchstens 1—3 Tage nachher, starke Schläge auf den Kopf erhalten hatten. Deshalb ist auch diese Annahme nicht ganz von der Hand zu weisen. Die manchmal ganz auffallenden zeitlichen Zusammenhänge zwischen Trauma und Infektion zwingen fast daran zu glauben.

Damit wäre zunächst allerdings nur eine lokale Störung der Immunität erklärt.

Eine allgemeine Schwächung aber könnte nur durch eine traumatische Chokwirkung verständlich werden. Denn es ist nicht einzusehen, warum ganz entfernt liegende Gebiete ohne weiteres durch ein Trauma, durch das sie gar nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden, eine veränderte Immuntätigkeit zeigen sollen. Ein Chok ist eine abnorme Reaktion nervöser Elemente des Körpers und kann sowohl auf einen starken körperlichen, sowie auch psychischen Reiz hin auftreten. Hiemit kommt also ein neuer Faktor, der psychische, in unseren Gesichtskreis, ehe wir die letzten Folgerungen aus dem körperlichen Moment gezogen haben. Eine körperliche oder eine seelische Alteration kann also ganz gleiche Reaktionen hervorrufen, folglich sind dem psychischen Trauma in dieser Beziehung die gleichen krankmachenden Wirkungen zuzuschreiben, wie wir sie für körperliche Insulte geneigt sind anzunehmen. Die Symptome des Choks zeigen uns, daß er ein Versagen der Funktionen des ganzen Körpers darstellt, somit auch eine Unter-

brechung oder Einschränkung der funktionellen Tätigkeit jeder Zelle bewirken kann. Insofern wäre es dann nicht verwunderlich, wenn darunter die Biologie der Abwehrstoffe leiden würde.

Für die Begutachtung von Unfällen solcher Art wäre also der Nachweis eines Choks zu erbringen. Dieser ist aber fast niemals schwer. So sagt auch Reichardt, daß ein richtiger Chok derart in die Augen springende Symptome erzeugt, daß diese nicht übersehen werden können. Wo ein Chok nicht beobachtet wurde, war er auch nicht vorhanden, es geht in solchen Fällen dann nicht an eine Schwächung der allgemeinen Immunitätsverhältnisse anzunehmen.

Endlich wäre noch als letzte Möglichkeit eine Aktivierung der Kokken selbst durch ein Trauma ins Auge zu fassen: Man müßte sich dies wohl so vorstellen, daß durch eine Erschütterung die Erreger gewissermaßen wachgerüttelt werden und so für den Körper gefährlich werden könnten. Diese Theorie ist, wie Plaut in einer erbetenen Auskunft sagt, nun schon gar nicht mehr vorstellbar und es würde an Mystizismus erinnern daraufhin einen Zusammenhang herleiten zu wollen. Nirgends in der Literatur finden sich auch hierüber ernsthafte Angaben.

Glaubt man sich nun nicht auf einen vollkommen negativen Boden den obig besprochenen Fragen gegenüber stellen zu können, so muß man zumindest, wie es fast ausnahmslos sämtliche einschlägige Autoren tun, an der Bedingung festhalten, daß *ein Trauma schwerer Art* vorgelegen haben muß. Schon die Vorstellung allein, daß unendlich viel mehr Menschen an Angina, Grippe, Pneumonie, Osteomyelitis, Meningitis und allen möglichen anderen Leiden erkranken müßten, wenn ein leichtes Trauma dies bewirken könnte, zwingt zu diesem Ergebnis.

Es ist also ersichtlich, daß bei einer Beurteilung des Zusammenhangs die Schwere der Verletzung bei dem Zustandekommen einer Infektion eine ausschlaggebende Rolle spielt. Angefangen mit den Verletzungen, die eine direkte Kommunikation des Schädelinnern mit dem Rachendache

schaffen, hinüber zu den Insulten, die noch eine nachweisbare Gewebsalteration erzeugten und weiter bis zu den Beobachtungen, die nur einen auffallenden zeitlichen Zusammenhang zwischen Trauma und der Erkrankung zeigen, ohne daß es möglich wäre eine anatomische Veränderung nachzuweisen, wird ein ursächlicher Zusammenhang beider Ereignisse immer fraglicher. So ist es als sicher zu bezeichnen, daß sich die Meningokokken entlang penetrierenden Wunden einen Weg in das Schädelinnere bahnen können; auch die Annahme, daß diese Keime an den anatomisch geschädigten Stellen besonders gut haften bleiben, besitzt einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit. Der ursächliche Zusammenhang aber in den übrigen Fällen kann nicht nur nicht als unsicher bezeichnet werden, sondern muß unsere stärksten Zweifel erwecken.

Die in der Literatur auffindbaren Fälle von Meningokokkenmeningitis sollen nun nach diesen Gesichtspunkten geordnet im folgenden kurz angeführt werden. Daß sich eine epidemische Cerebrospinalmeningitis im Anschluß an ein Schädeltrauma entwickelt, gehört immerhin zu den seltenen Ereignissen.

Korbsch teilt in seiner Sammelstatistik von 1923 14, von den verschiedensten Autoren beschriebene Beobachtungen mit. Gutzeit und Stern besprechen, im Anschluß an ein Obergutachten, einen Fall aus dem Jahre 1928. Lode und Schmittermeier berichten einen Fall aus dem Jahre 1929; 1930 veröffentlichte Torrance einen weiteren Fall; Aronowitsch gibt drei eigene Beobachtungen wieder, bei denen die Meningokokkenmeningitis im Anschluß an ein Trauma auftrat. Wie weit noch einige Fälle von eitriger Meningitis, bei welcher keine Keime gefunden wurden, (Garrè, Torrance, Hanke, Aronowitsch) zu der echten epidemischen Meningitis zu zählen sind, muß dahingestellt bleiben. Goebel und Heß nehmen eine Zugehörigkeit an, wenn sie schreiben: da bei allen Formen von nicht epidemischer Meningitis die Erreger im Ausstrich leicht zu finden sind, spricht ein Punktat mit vorwiegend polymorphkernigen Leukocyten ohne Bakterien von vornherein für echte

Genickstarre. Hanke versucht die aseptische eitrige Meningitis durch die Bakterizidie des leukocytenhaltigen Liquors zu erklären oder als toxische Reizmeningitis aufzufassen.

Von der echten epidemischen Meningokokkenmeningitis sind also nur 20 einwandfreie Fälle in der auffindbaren Literatur veröffentlicht. 3 von englischen Autoren mitgeteilte Beobachtungen müssen bei einer Beurteilung unberücksichtigt bleiben, da es nicht möglich war in der zur Verfügung stehenden Literatur nähere Angaben über die Art und die Wirkung des Traumas zu erlangen.

Von den noch verbleibenden Fällen ist die Mehrzahl durch eine Basisfraktur kompliziert. In diesen Fällen bereitet die Frage des Zusammenhanges keine großen Schwierigkeiten, sie ist zu bejahen; der Weg, den die Infektionserreger gegangen sind, ist sichtbar und beweisbar, er wird auch von sämtlichen Autoren anerkannt.

Eine besondere Stellung nimmt der Fall von Schreiber und Goldberg ein, bei dem die durch eine Nasenoperation geschaffenen besonderen Wundverhältnisse einerseits eine Invasionsstätte gebildet haben, andererseits aber durch die operative Schädigung des Gewebes ein günstiger Boden für die Entwicklung des Meningokokkus vorhanden war. Auch hier ist ein Zusammenhang als sehr wahrscheinlich zu bezeichnen.

Schwerer zu beurteilen sind die restlichen 6 Fälle, die nach der Schwere des Traumas geordnet hier kurz angeführt werden sollen.

1. (Fall Taschenberg 1905). Ein 18 jähriger Mann stürzte vier Stockwerke herab. Erst eineinhalb Monate später begann die Meningitis mit Kopf, Nacken und Gelenkschmerzen, Schwindel, Ohnmachtsanfällen und heftiger Erregung; beachtenswert sind noch die zahlreichen Ekchymosen an den unteren Extremitäten. Die Diagnose wurde durch die Lumbalpunktion gesichert. Der Fall ging in Heilung aus.

Wohl handelt es sich um ein Trauma sehr schwerer Art, das wohl imstande sein konnte eine Gewebszertrümmerung zu setzen. Hirnanatomisch konnte jedoch nichts nachgewiesen werden, da der Patient wieder gesund wurde.

Was aber gegen die Annahme eines Zusammenhangs ganz bedenklich ins Gewicht fällt, ist der lange Zeitabstand zwischen Sturz und Krankheit, während der sich der Patient offenbar vollkommen wohlgeföhlt hat. In diesem Zeitraum heilen nach den Erfahrungen solche nicht allzuschweren Verletzungen, denn um solche müßte es sich auf Grund des Fehlens von klinischen Erscheinungen nur gehandelt haben, vollkommen aus. Der Zusammenhang in diesem Falle ist also ziemlich unwahrscheinlich; auch der Beobachter selbst zweifelt an einem solchen.

2. (Fall Taschenberg 1908). Ein 52 jähriger Potator wurde mit dem Schlagring derart an die Stirne getroffen, daß er die Besinnung verlor. 5 Tage danach verfiel der Patient in ein Beschäftigungsdelir; später stellten sich auch deutliche Zeichen einer Meningitis ein, welcher der Patient nach einem Krankheitsverlauf von 6 Wochen erlag. Die Autopsie ergab eine Entzündung der Meningen an der Hirnbasis und dem Rückenmark. Nach Korbisch handelte es sich tatsächlich um eine echte Meningokokkenmeningitis. Eine Verletzung der knöchernen Schädelkapsel ist im Bericht nicht erwähnt, die weichen Schädeldecken waren intakt.

Etwas wahrscheinlicher scheint in diesem Falle die Erkrankung auf das Trauma zurückzuführen zu sein. Zwar handelt es sich hier um eine weniger schwere Verletzung als im vorigen Falle, doch ist der zwischen beiden Ereignissen liegende Zeitabstand nicht geeignet einen Zusammenhang einfach von der Hand zu weisen. Man könnte sich vorstellen, daß, mehr noch auf Grund einer kleinen Gewebsläsion, als auf der Theorie von einer Schwächung der allgemeinen oder lokalen Widerstandskräfte, eine Begünstigung der Infektion stattgefunden hat. Besonders zu beachten ist hier der chronische Alkoholismus, der zweifellos schon von sich aus eine stärkere Anfälligkeit für Erkrankungen schafft. Wie gesagt, man kann sich noch einen Zusammenhang vorstellen, beweisen kann man ihn aber nicht, damit ist also auch nichts gewonnen.

3. (Fall Reiche). Ein 61 jähriger Mann war drei Wochen vor der Erkrankung eine Treppe herabgefiürzt. Die Krank-

heit zeichnete sich aus durch Benommenheit, Sopor, Kernig, Schmerzhaftigkeit der Wirbelsäule und einer Reihe neurologischer Symptome. Am 3. Tage Exitus letalis. Keine Verletzungen der Schädeldecke und der äußeren Haut. In beiden Stirnpolen fand sich je eine mit klarer Flüssigkeit gefüllte Cyste. (Patient hatte schon vor vielen Jahren einmal eine Basisfraktur erlitten). Die Untersuchung des Eiters ergab intrazellulär gelegene, gramnegative, fennelförmige Diplokokken. Im Züchtungsverfahren erwiesen sie sich als Reinkulturen Weichselbaumscher Meningokokken.

Auch dieser Fall bringt uns nicht weiter. Die Schwere der bei einem Treppensturz erlittenen Erschütterung entzieht sich einer brauchbaren Beurteilung. Offenbar war auch dieser Mann in der Zwischenzeit frei von Beschwerden. Daß die vor Jahren erlittenen Basisfraktur in ursächlichem Zusammenhang damit steht, ist nicht sehr wahrscheinlich, kann freilich nicht absolut ausgeschlossen werden. Das Fehlen von Brückensymptomen setzt aber die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs außerordentlich herab.

In den letzten drei Fällen war das Trauma immerhin noch von ziemlich erheblicher Art. Kommen wir hier schon zu keiner klaren Antwort im Sinne einer Bejahung, dann noch viel weniger in den nun folgenden. Hier läßt sich eher eine Verneinung rechtfertigen.

4. (Fall Lenhardt). Ein 9 jähriges Mädchen, das einen Schlag auf den Kopf erhalten hatte, erkrankte bereits am nächsten Tag mit Kopfschmerzen und Erbrechen. Es trat tiefe Benommenheit, große Unruhe, Opisthotonus und Temperatursteigerung bis zu 40° hinzu. Die sofort vorgenommene Lumbalpunktion ergab einen Anfangsdruck von 300 mm Hg; die Flüssigkeit war stark getrübt, in derselben im Ausstrich und in der Kultur Weichselbaumsche Diplokokken. Nach dieser Punktion besserte sich der Zustand und nach insgesamt 7 Tagen waren die Erscheinungen wieder völlig geschwunden.

Trotz des zeitlichen Zusammentreffens ist hier ein Zusammenhang kaum anzunehmen; eher besteht noch die Möglichkeit, daß die Krankheit zur Zeit des Traumas schon

ihren Anfang genommen hatte; als sie aber erst am nächsten Tage durch ihre heftigen Symptome auffiel, erinnerte man sich des geringen Schlages und glaubte damit einen Grund für die Erkrankung gefunden zu haben. Sollte aber wirklich das Trauma dabei einen geringen Einfluß gehabt haben, so ist dazu zu sagen, daß eine derartige Krankheitsbereitschaft bestanden haben muß, daß auch andere tägliche Zufälligkeiten ebenso gut eine Krankheit herbeigeführt haben würden, das Trauma also garnicht ins Gewicht fällt.

5. (Fall Aronowitsch 1931). Ein 23 jähriger Matrose erlitt 5 Tage vor der Meningokokkenenerkrankung eine traumatische Schädigung des linken Armes, wobei das linke Schlüsselbein vom Schulterblatt abgerissen wurde. Er erkrankte mit Doppelsehen, Kopfschmerz und Fieber und bot weiterhin das ausgeprägte Bild einer Meningitis mit Hervortreten des neurologischen Befundes. Im Liquor Nachweis von Weichselbaumchen Diplokokken. Der Fall ging in Heilung aus.

Aronowitsch nimmt hier einen Kausalzusammenhang auf Grund der Aktivierung der latenten Meningokokkeninfektion unter Wirkung des traumatischen Chokes an. Von wirklichen Chokesymptomen ist aber nichts erwähnt, sicherlich hat ein solcher auch nicht stattgefunden. Man muß also hier den Zusammenhang mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ablehnen.

6. (Gutzeit und Stern 1928). Der Patient erkrankte 4 Wochen nachdem ihm angeblich ein Ziegelstein auf dem Kopf gefallen war an eitriger Meningitis. Nach dreiwöchentlicher Krankheitsdauer verstarb er. Meningokokken wurden im Lumbalpunktat festgestellt. Die Sektion ergab keine Anhaltspunkte für eine Verletzung.

Wie die beiden Autoren nach dem Aktenmaterial nachweisen, hat das angeschuldigte Trauma unter Umständen gar nicht stattgefunden, wenn doch, dann kann es nur allerleichtester Art gewesen sein. Die große Zeitspanne zwischen beiden Ereignissen spricht ebenfalls vollkommen gegen einen Zusammenhang. Daß irgendwelche Brückensymptome gestanden haben ist durch nichts erwiesen. Unter diesen Umständen muß man, wie es auch die Autoren tun, einen Zusammenhang ablehnen.

Eigener Fall.

Im Anschluß daran möchte ich einen Fall von epidemischer Meningokokkenmeningitis beschreiben, welcher im August des Jahres 1934 im Krankenhaus zu Nürnberg beobachtet wurde, mit dem Tode des betroffenen endigte und letzten Endes zu einer strafrechtlichen Behandlung des Falles Veranlassung gab. Die beiden abgegebenen Gutachten widersprachen sich insofern, als der erste Gutachter (der zuständige Landgerichtsarzt) einen Zusammenhang für wahrscheinlich hielt, der zweite Gutachter (Herr Geheimrat Prof. Dr. Specht) sich nicht dazu entschließen konnte diese Frage zu bejahen.

Der Tatbestand war folgender: Ein Mitte der Fünfziger stehender Mann ging zu Fuß am 14. 8. 34. auf einer breiten Landstraße und wurde dabei von einem sich in gleicher Richtung bewegendem Motorradfahrer, direkt von hinten, angefahren und mit dem Gesicht nach vorne zu Boden geworfen. Der Motorradfahrer hatte eine Geschwindigkeit von 30–40 km pro Stunde. Der Fahrer stürzte ebenfalls, erhob sich aber sogleich wieder um nach den Folgen des Unglücks zu sehen. Unser Patient war inzwischen ebenfalls wieder aus einer ganz kurzen Bewußtlosigkeit erwacht. Es entstand dann sofort eine Debatte über die Schuldfrage. Daraufhin gingen beide zu Fuß etwa 150 m weiter; der Patient setzte sich, während der Führer des Kraftrades eines verlorenen Gegenstands wegen nochmals zurück ging, und wurde dort von einem anderen, zufällig des Weges kommenden Motorradfahrer auf einem Steinhaufen sitzend getroffen. Er wurde dann von letzterem auf seinem Sozius sitz nach Hause gefahren. Dort ging es ihm zunächst ganz gut; am 18. 8. mußte er schwer erkrankt in das Nürnberger Städtische Krankenhaus gebracht werden. Da Patient leicht desorientiert war, wurde die Anamnese von der ihn begleitenden Tochter erhoben.

Diese gab an, daß der Vater nach dem Unfall daheim einmal erbrochen und über Kopfschmerzen geklagt habe, sonst sei aber in den nächsten Tagen alles gut gewesen.

Seit heute klage er über Übelkeit und starke Kopfschmerzen; er hätte nochmals wiederholt erbrochen, habe gefiebert und sei auch unruhig gewesen.

Aufnahmebefund:

Hochfiebernder älterer Mann, leicht benommen und desorientiert, reagiert aber auf Anruf. Starke Nackensteifigkeit, angedeuteter Kernig, starke Berührungsüberempfindlichkeit, wird sofort sehr unruhig. Pupillen mittelweit, reagieren auf Licht, keine Differenz. Gesteigerte Grundgelenkreflexe, rechts etwas mehr wie links. P.S.R. rechts stärker wie links, A.S.R. links weniger stark als rechts, aber gut auslösbar. Babinski, Gordon und Oppenheim rechts positiv. Puls gefühlt 100 p. min.

Kleine Schürfwunde über der rechten Augenbraue, älteres Hämatom hier. Außerdem langezogene Schürfwunde an der Innenseite des rechten Oberschenkels. Herz-tätigkeit kräftig, Töne anscheinend rein. Lumbalpunktion: Liquor trüb, unter wenig erhöhtem Druck.

20. 8. 34. Die meningitischen Erscheinungen sind vollkommen abgeklungen. Es sind keine pathologischen Reflexe mehr nachweisbar. Patient selbst fühlt sich subjektiv vollkommen wohl. Er ist sehr munter lacht und ist zu Scherzen aufgelegt. Die Temperatur beträgt 37,50.

21. 8. 34. Subjektiv weiter Wohlbefinden, neurologisch kein krankhafter Befund nachweisbar. Suboccipitalpunktion: Einstich gelingt glatt, in langsamer Tropfenfolge fließt leicht milchig getrübler Liquor ab. Untersuchungsergebnis siehe später!

23. 8. 34. Die Temperaturen bewegen sich ständig zwischen 39,5 und 38,4; gleichwohl fühlt sich der Patient subjektiv sehr wohl. Er bringt nie Klagen oder Beschwerden vor. Eine Untersuchung durch einen otiatr. Fachmann ergab keinen pathologischen Befund an beiden Ohren nur die Prüfung der Hörschärfe eine Herabsetzung auf dem rechten Ohr. Umgangssprache wird auf dieser Seite auf eine Entfernung von ungefähr 1/2 m gehört. Weber nach links lateralisiert, Rinne und Knochen-Luftleitung stark ver-

kürzt. C 4 wird durch Luftleitung rechts nicht gehört. Galtonpfeife starke Einengung der oberen Tongrenze. Nase o. B. Keine Anhaltspunkte für eine Labyrinthitis.

Suboccipitalpunktion gelingt nicht. Lumbalpunktion: Einstich gelingt glatt, fast wasserklarer Liquor fließt in langsamer Tropfenfolge ab. Ergebnis der Untersuchung siehe später! Heutige Abendtemperatur 39,4, Allgemeinbefinden subjektiv wohl, objektiv Verschlechterung deutlich erkennbar. Neurologischer Befund: Babinski rechts positiv, Nackensteifigkeit angedeutet, kein Kernig. Übriger Befund unverändert.

25. 8. 34. Patient schläft fast den ganzen Tag. Kommt er auf kurze Zeit aus seiner Benommenheit zu sich so behauptet er, daß es ihm ganz gut gehe. Die heutige Abendtemperatur 38,4. Ausgesprochene Nackensteifigkeit, Kernig angedeutet. Grundgelenkreflex besonders vom Kleinfinger lebhaft auslösbar. Babinski, Gordon, Oppenheim rechts positiv, links negativ. B.D.R. nicht sicher. Finger-Nase-Versuch sicher. Keine Sensibilitätsausfälle. Sprache wohl infolge der Benommenheit leicht verworren. Abend um 22 Uhr Ansteigen der Temperatur auf 39,7.

Von dem Vorstand der Nürnberger bakteriologischen Untersuchungsabteilung wurde mitgeteilt, daß im Liquor vom 24. 8. Meningokokken mit 70⁰/₁₀₀ Sicherheit nachgewiesen wurden. Alle anderen Kulturen waren bisher einwandfrei steril.

Patient erhält 10 ccm Meningokokkenserum i. v. Lumbalpunktion: Einstich gelingt glatt. Es fließt stark xanthochromer Liquor unter erhöhtem Drucke ab.

26. 8. 34. Patient erhält alle zwei Stunden Cardiazol und Koffein. Heute beträgt die Morgentemperatur 37,4.

28. 8. 34. Nach weiterer Verschlechterung und weiterer Temperaturzunahme heute abend um 21 Uhr Exitus letalis.

Ergebnisse der bakteriologischen Untersuchungen des Liquors vom 19. 8. 34, vom 21. 9. 34 und vom 24. 8. 34.

Das Aussehen des Liquors nach den drei Berichten war: eitrig getrübt; vollständig trüb; trüb. Die bakteriologische Untersuchung zeitigte bei den ersten beiden Unter-

suchungen kein positives Resultat; die Kulturen waren steril geblieben. Aus dem Liquor aber vom 24. 8. 34. konnten Meningokokken gezüchtet werden.

Die außerdem noch angestellte Wa--R ergab nicht eindeutig zu beurteilende Ergebnisse.

Auszug aus dem Sektionsprotokoll. (Ausgeführt von dem zuständigen Landgerichtsarzt).

A. Äußere Besichtigung:

1. Leiche eines Mannes im fortgeschrittenen Lebensalter, 1,75 m groß, Ernährungs- und Kräftezustand gut.
2. Die Haut grauweiß, an den abhängigen Partien blaß-violette Totenflecken.
3. Totenstarre überall vorhanden.
4. Die Bindehäute der Augen gelblich angefärbt, die Hornhäute getrübt, die Löcher rund.
5. Der Mund leicht geöffnet, die Schleimhaut blaß, aus dem Mund entleert sich blutig gefärbte Flüssigkeit.
6. In der Nackengegend und in der Lendengegend je ein Heftpflasterverband, unter dem sich je eine ärztlich gesetzte Einstichstelle befindet.
7. Der Brustkorb gut gewölbt, der Bauch ist aufgetrieben.
8. In der unteren Hälfte des rechten Unterschenkels an dessen Vorderseite eine alte solide Unterschenkelgeschwürsnarbe.

B. Innere Besichtigung:

I. Kopfhöhle:

9. Die Kopfschwarte unverfehrt, an der Innenseite leicht gelblich verfärbt.
10. Das knöcherne Schädeldach unverfehrt, schwer, bis zu 0,4 cm stark.
11. Die harte Hirnhaut mit dem knöchernen Schädel verwachsen.
12. Im Längsblutleiter flüssiges und geronnenes Blut.
13. Die harte Hirnhaut nicht verdickt.
14. Zwischen den weichen Hirnhäuten sehr viele trübe wässrige Flüssigkeit.

15. Die Gefäße der weichen Hirnhäute stark blutgefüllt, die weichen Hirnhäute verdickt, getrübt, an einzelnen Stellen sulzig.

16. Die Gehirnkammern leer, das Gehirn sehr blutreich, feucht, zeigt überall die gewöhnliche Zeichnung, nirgends eine Blutung oder sonstige Veränderungen.

17. Die Blutleiter des Gehirngrundes stark gefüllt, unverfehrt. In den Paukenhöhlen und Nebenhöhlen der Nase kein fremder Inhalt.

II. Die Besichtigung der übrigen Organe ergibt zur Beurteilung der Krankheit nichts mehr wesentliches. Die noch aufgefundenen anatomischen Veränderungen seien noch kurz erwähnt.

Das Herz war vergrößert, die Kranzadern erweitert, ihre Innenhaut gelblich gefleckt. Am Abgangsteil der Aorta eine ringförmig angeordnete Kalkeinlagerung. Die rechte Lunge läßt sich nur unter Substanzverlust auslösen, ist an der Oberfläche mit schwieligen Fetzen bedeckt. Lungenzeichnung beiderseit schwer erkennbar. Milzsubstanz schmutzigrot erweicht, Struktur verwaschen. Die Leber groß, mit abge schnürtem, ausgezogenem linken Lappen, an der Oberfläche schmutzig ziegelrot, an der Schnittfläche trocken, lehmfarbig, blutarm.

Inhalt der beiden Gutachten:

In dem ersten Gutachten kommt der Landgerichtsarzt zu dem Ergebnis, daß, nachdem der Patient vollkommen gesund gewesen und schon erkennbar 4 Tage nach dem Unfall erkrankt sei und diese Erkrankung zum Ableben geführt habe, der Unfall schuld daran sei.

Zu etwas anderer Ansicht gelangte in seinem Obergutachten Herr Geheimrat Prof. Dr. Specht, welcher die Geringfügigkeit der Verletzung und der Gehirnerschütterung betont, die deshalb nicht ohne weiteres als Ursache für die spätere Erkrankung angesprochen werden kann, wenn auch die Möglichkeit nicht absolut bestritten werden soll. Geheimrat Dr. Specht berücksichtigt außerdem die beiden anderen Möglichkeiten, die sich aus der Ubiquität des

Meningokokkus und der Inkubationszeit der Meningokokkenmeningitis ergeben:

1. Daß sich Z. schon in der Richtung auf die Erkrankung befunden haben kann;

2. Daß Z. erst nach dem Unfall von gesunden Keimträgern in seiner Umgebung angesteckt worden sein kann.

Aus diesen Gründen konnte, unter Berücksichtigung der gesamten Literatur, das Ergebnis nicht eindeutig ausfallen.

Eigene Meinung.

Es handelt sich hier um eine eitrige Meningitis, die 4 Tage nach dem Unfall auftrat. Daß dabei echte Meningokokken die Erreger waren, wurde durch die bakteriologische Untersuchung nachgewiesen. Wenn auch die Kulturen der ersten 6 Krankheitstage ein negatives Ergebnis zeigten, so ist dies kein Beweis dafür, daß sich die echten Kokken erst zu diesem Zeitpunkt dazugesellten; die bei den ersten Punktaten gefundene Spärlichkeit der Bakterien und die schwere Züchtbarkeit erklären ein solches Verhalten vollkommen. Ist der sichere Nachweis der Meningokokken aus dem Nasenrachensekret sehr schwierig, da manche andere dort vorkommenden Kokken färberisch und kulturell oft weitgehende Ähnlichkeit zeigen, so ist dies bei kokkenpositivem Lumbalpunktat nicht in diesem Maße der Fall. Hier erreicht die Feststellung von gramnegativen, intrazellulär liegende Kokken für die Diagnose bereits einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit. Absolut sicher wird allerdings auch hier erst der Beweis durch den positiven Ausfall der Agglutination erbracht. In der bakteriologischen Untersuchung wurden in unserem Falle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit echte Meningokokken festgestellt. Eine Verwechslung, insbesondere mit dem Jägerschen Kokkus, der in der Literatur schon heftigen Streit hervorgerufen hat, kann also ausgeschlossen werden.

Weiterhin fällt an dem Krankheitsbild auf, daß es in engem Zusammenhang mit dem Unfall steht. Die Inkubationszeit der Meningokokkenmeningitis beträgt 1—4 Tage

und ebenfalls innerhalb der Zeitspanne von 4 Tagen zeigten sich die ersten Meningitis-symptome, sodaß die Tatsachen in dieser Beziehung scheinbar auf einen Zusammenhang hinweisen. Mit derselben Zeitspanne ist aber auch noch vereinbar, daß die Infektion vorher oder auch nach dem Trauma erfolgt sein kann; somit ist die Möglichkeit, daß es sich um eine spontane Meningitis, ohne Zusammenhang mit dem Unfall handelt, nicht sicher auszuschließen. Zur Stützung dieser Annahme kann angeführt werden, daß keine deutlichen Brückensymptome vorhanden waren. Bei der Aufnahme ins Krankenhaus, zu einer Zeit also, in welcher die Schwere der Krankheit noch nicht von den Angehörigen erkannt war, äußerte die Tochter: in der Zwischenzeit sei alles ganz gut gewesen.

Daß unser Patient Bazillenträger war, ist nicht auszuschließen; denn wie eingangs der Arbeit erwähnt, ist dies gar kein so seltenes Ereignis als gemeinhin angenommen wird. Doch nicht einmal dies ist nötig. Es läßt sich ganz zwanglos mit der Inkubationszeit vereinbaren, wenn eine Infektion erst nach dem Unfall stattgefunden hat. Dies kann durch Personen aus seiner Umgebung, durch Besucher usw. geschehen sein, die selbst ohne irgend welche Erscheinungen zu bieten, die Bazillen schon lange beherbergten. Die Frage des Zusammenhangs muß also in diesem Punkte offen gelassen werden.

Einfacher wäre die Zusammenhangsfrage auf anatomischer Basis zu beurteilen, hier aber muß die Entscheidung absolut negativ ausfallen. Wohl waren bei dem Unfall zwei geringe äußere Verletzungen, die eine über der rechten Augenbraune, die andere am Oberschenkel gesetzt worden. Beide waren nicht erheblicher Art; beide konnten nur als geringe Hautabschürfungen bezeichnet werden, wie sie im täglichen Leben sehr häufig vorkommen. 4 Tage nach dem Unfall konnten die Verletzungen bei der Einlieferung ins Krankenhaus noch nachgewiesen werden. Schon bei der Sektion, die 14 Tage nach dem Unfall erfolgte, war nichts mehr von den beiden Wunden zu sehen. Eine dieser beiden Verletzungen als Eintrittspforte für die Infektion an-

zusehen geht nicht an, einerseits wegen der Geringfügigkeit, dann aber noch besonders aus einem ganz anderen Grunde. Hätte nach diesen geringen Gewebdefekten eine Streptokokken- bzw. Staphylokokkenmeningitis stattgefunden, so würde trotz der Unerheblichkeit ein Einfluß auf die spätere Erkrankung sehr viel wahrscheinlicher sein als hier, wo die Erreger echte Weichselbaumsche Diplokokken waren. Denn auf der äußeren Haut des Menschen ist dieser Kokkus nicht lebensfähig, kann also auch nicht von diesen Stellen aus in den Körperkreislauf gebracht werden. Von irgend einer Verletzung aber derjenigen Stellen, die den Meningokokkus beherbergen, wie die Nasen und Rachen Schleimhaut, ist nichts erwähnt. Sicher würde der Patient eine solche Verletzung infolge der Blutung aus dem Mund oder der Nase bemerkt und darüber Angaben gemacht haben. Doch nichts von alledem.

Als einzige Stütze für die Annahme eines Zusammenhangs auf anatomischer Basis könnte nur noch die Bildung eines „locus minoris resistentiae“ an der Pia mater selbst gelten, doch auch hier hat sich nicht das allergeringste nachweisen lassen. Daß eine Verletzung solcher Art in dem entzündeten Gewebe bereits abgeheilt sein könnte ist unwahrscheinlich und kein stichhaltiger Einwand.

Man hat auch schon versucht aus der Lokalisation der Entzündung für den Zusammenhang gewisse Schlüsse zu ziehen. Da die gewöhnliche genuine Meningitis sich von der Basis her ausbreitet, muß ein atypischer Erkrankungsherd den Verdacht auf andere Momente lenken. Für eine traumatische Genese würde natürlich das Übereinstimmen des Ortes des äußeren Schlages und des Ortes der Meningitis-erkrankung sprechen; auch ein direkt gegenüber lokalisierter Herd würde dem nicht widersprechen, sondern auf Grund einer Contrecoupwirkung verständlich sein. Jedenfalls müßte aber eine gewisse Abhängigkeit des Entzündungsherdes von dem des Traumas gewahrt sein. Die Sektion stellte jedoch nur eine gleichmäßig verteilte Leptomeningentrübung fest.

Man könnte noch in dieser Hinsicht Bedenken geltend

machen, daß der Untersucher geringe vorhandene Verletzungen übersehen habe. Mit dieser menschlichen Fehlerquelle, die einmal trotz größter Gewissenhaftigkeit auftreten kann, ist, wenn auch in sehr seltenen Fällen, zu rechnen. Darauf aufbauend einen Befund jedoch als unrichtig annehmen zu wollen wäre doch eine unbillige Voreingenommenheit.

Weitere Argumente, die unter Umständen einen Zusammenhang erklären können, könnten wir nur noch in der Theorie der Schwächung der Widerstandskräfte auf ein Trauma hin, der starken Anfälligkeit des Körpers auf einen heftigen psychischen Insult, endlich noch in einer Aktivierung der Kokken direkt durch das Trauma finden. Setzen wir uns zunächst mit der letzten Ansicht auseinander!

Die Kokken seien durch die Erschütterung gewissermaßen wild gemacht worden und hätten dann, infolge der größeren Aktivität, zur Erkrankung geführt. Schon die Vorstellung eines derartigen Vorgangs ist unmöglich, viel weniger noch haben sich bis jetzt experimentelle noch klinische Anhaltspunkte dafür ergeben. Die von uns zugezogenen hiesigen Fachautoritäten lehnen diese Ansicht als unhaltbar rundweg ab.

Nicht viel größere Wahrscheinlichkeit besitzt das Bestreben einen Zusammenhang auf Grund eines psychischen Insults herzuleiten. Ist doch diese Ansicht selbst in den Fällen umstritten, in denen psychische Traumen schwerer Art vorlagen; mit Recht ist daher, falls ein Einfluß angenommen werden soll, ein tatsächlicher Chok zu fordern. Doch selbst die Bejahung der Frage, ob äußerst heftige Schreckwirkungen eine Schwächung der Immunitätsverhältnisse bewerkstelligen können, würde uns hier nicht weiter bringen. Denn das psychische Trauma, das der Patient überstanden hat, war nicht größer als es täglich zahlreiche Menschen erleiden ohne daran Schaden zu nehmen. Von einer überstandenen Todesangst kann nun schon gar nicht die Rede sein; denn schon in der nächsten Minute nach dem Unfall finden wir den Patienten in der Debatte mit dem Beschuldigten begriffen. Man könnte nun noch einwerfen: die

Symptome des Choks sind eine Zeit lang latent geblieben und sind erst später aufgetreten. Doch auch davon ist nicht das geringste erwähnt. Zu solchen Annahmen schreibt Reichardt: „Der Gutachter möge vor dem psychischen Insult oder Chok keinen allzugroßen Respekt haben, liegt wirklich ein erheblicher Insult vor, dann sind die akuten Symptome so unverkennbar und häufig so stürmisch, daß ein Zweifel an der Diagnose nicht möglich ist. Fehlen die akuten Symptome, dann ist es nicht nötig und meistens sogar falsch, eine wesentliche Insult- oder Chokwirkung anzunehmen. Ein Insult oder Chok schädigt entweder akut oder überhaupt nicht“.

Endlich wäre noch auf eine Störung des kolloidalen Zustands der Zelle auf das Trauma hin, durch die eine Krankheitsbereitschaft erzeugt werden soll, näher einzugehen. Daß ein Zusammenhang auf dieser Basis möglich ist, kann nach den früheren Ausführungen nicht ganz geleugnet werden. Versuche von Rickers haben außerdem gezeigt, daß Traumen des Zentralnervensystems oft eine erhebliche Störung des Kreislaufs nach sich ziehen können, die oft geraume Zeit brauchen um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Weiter sei, wie schon früher erwähnt, an die Versuche von Ehrnrooth erinnert. Eine Störung der biologischen, an den kolloidalen Zustand gebundenen Zellfunktionen, könnte wohl in der Lage sein einmal eine Infektion zu propagieren. Zu dieser Zeit müßten allerdings durch einen üblen Zufall die verhängnisvollen Keime im Blute kreisen. Unter allen Umständen ist aber immer dabei eine erhebliche Stärke des Insults vorauszusetzen. Dies kann aber wiederum bei unseren Fall, selbst bei vorsichtiger Beurteilung, nicht behauptet werden. Reichardt teilt die *Commotio cerebri* in 3 Klassen ein. Er nennt eine leichte Gehirnerschütterung eine solche, bei der das Bewußtsein in 30 Minuten wieder vorhanden ist. In diesem Sinne kann die *Commotio* unseres Patienten nur als leichte, wenn nicht als leichteste bezeichnet werden; denn nach Aussage des Sohnes des Patienten sagte dieser bei der Schilderung des Hergangs: „beim Aufrappeln (Patient) kam ein Mann (Beschuldigter) aus dem Graben von hinten“.

Die Bewußtlosigkeit kann sich also nur auf einige Sekunden erstreckt haben, denn der Beschuldigte war nach dem Sturze unverfehrt und hat sich natürlich gleich wieder erhoben. Daß der Patient zu Hause einmal erbrochen hat, ist nicht von großer Bedeutung; es ist höchstens der Beweis, daß es sich tatsächlich um eine Commotio gehandelt. Nach Ritter kann darin nur ein Hinweis auf die Erschütterung der medulla oblongata erblickt werden. Patient war außerdem nach dem Unfall wieder vollkommen klar und geordnet, da er sich sofort um die Schuldfrage bemühte, 150 m weit ging, außerdem darnach auf dem Soziusitz eines Motorrades, das doch bestimmt kein passendes Krankenverkehrsmittel darstellt, heimfahren konnte. Bei Berücksichtigung aller dieser Umstände verliert die Wahrscheinlichkeit des Zusammenhangs auch auf dieser Grundlage erheblich an Boden, damit soll nicht behauptet werden, daß der Zusammenhang eine Unmöglichkeit sei. Solange wir nicht imstande sind sichere Beweise für diese Unmöglichkeit anzugeben, solange dürfen wir auch kein absolutes „Nein“ aussprechen. Da über das Wesen der Meningokokkeninfektion noch Dunkel gebreitet ist und wir zur Erklärung des Infektionsmodus nur auf Vermutungen und Kombinationen angewiesen sind, können wir auch nicht an der Bedeutung eines Traumas, selbst geringfügiger Art, bei dem Zustandekommen dieser Erkrankung achtlos vorüber gehen.

Der wissenschaftlichen Betrachtung eines solchen Falles steht in gewissem Sinn die gutachtliche gegenüber, denn hier ist es nötig den Standpunkt genauer zu präzisieren. Diese Entscheidung wird, wie auch in unserem Fall, trotzdem nicht immer eindeutig getroffen werden können. Unter Berücksichtigung aber aller Faktoren müssen wir dazu neigen einen Zusammenhang zu negieren, wenn auch der Schein dagegen spricht.

In der Beurteilung der traumatischen Meningitis hat sich im Laufe der Zeiten nahezu ein Kreislauf vollzogen. Ob sich der Kreis wirklich schließen wird, hängt von der weiteren Erforschung solcher unklarer Fälle ab. Während man noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, vor dem

Bekanntwerden des Wesens der Infektion, die Anschauung vertrat, daß jede Gehirnerschütterung die Entzündung der Häute bedingen könne, gab v. Bergmann 1880 zu einer gänzlichen Änderung der Ansicht Veranlassung, wenn er sagt: „Der wesentliche Faktor in der Ätiologie der traumatischen Meningitis ist der Luftzutritt; denn eine suppurative Meningitis bei undurchtrennten Weichteilen gibt es nicht.“ Die bedeutende Erweiterung der Kenntnisse auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten läßt heute diese Anschauung als nicht mehr vollkommen haltbar erscheinen. Einige Autoren sind geneigt, wenn auch auf ganz anderer Basis, nicht nur nicht zur alten Anschauung zurückzukehren, sondern erweitern diese noch, da sie jedem erheblichen Trauma überhaupt die Möglichkeit einräumen, allerdings auf dem Umwege einer Herabsetzung der allgemeinen Widerstandskräfte, unter Umständen eine Meningitis zu erzeugen. Dieser Standpunkt wird aber von der Mehrzahl der Sachverständigen nicht geteilt und als zu weit gehend betrachtet. Auch eine Besprechung des Herrn Geheimrat Dr. Specht anlässlich seines Gutachtens mit fast sämtlichen Professoren der Medizin in Erlangen zeitigte ein klares non liquet. Nach den eingeholten Ansichten von Herrn Professor Dr. Spielmeier und Herrn Professor Dr. Plaut können sich diese zwar nicht dazu entschließen einen Zusammenhang in derartig merkwürdigen Fällen von vorneherein auszuschließen, kommen aber zu dem eindeutigen Schluß, daß noch weniger ein Zusammenhang bejaht werden kann.

Zum Schluß der Arbeit ist es mir eine angenehme Pflicht Herrn Geheimrat Professor Dr. Specht für die Überlassung des Themas und die jederzeitige bereitwillige Unterstützung bei der Verfassung der Arbeit meinen ergebensten Dank auszusprechen.

Schrifttum.

- Aronowitsch*, Meningitis und Trauma. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde 1933; 129, 130; S. 72.
- Bergel*, Jahresberichte der gesamten Medizin 1908; Bd. 2; S. 351.
- Bergmann*, Chirurgische Behandlung der Hirnkrankheiten. Berlin 1899.
- Brüning*, Gibt es eine traumatische Appendizitis? Mü. Med. Wochenschr. 1927; S. 2180.
- Curtschmann*, Über posttraumatische Meningitis. Deutsche Med. Wochenschr. 1904, II; S. 1054.
- Eckermann*, Ursächlicher Zusammenhang zwischen Osteomyelitis u. Trauma. Diss. Bonn 1931.
- Ehrnrooth*, Zeitschrift für die gesamte gerichtliche Medizin 12.
- Engel*, Tod an eitriger Meningokokkenmeningitis nicht Folge einer Kopfverletzung. Med. Klinik Jahrgang 19 S. 541.
- Friedmann*, Über die Lentaform der Meningokokkensepsis. Deutsche Med. Wochenschr. 1926 Nr. 18.
- Fürst und Gruber*, Jahresberichte der gesamten Medizin 1910 Bd. 2; S. 7.
- Gruber*, Zur Lehre vom Wesen, Verbreitung und Bekämpfung der Meningokokkenmeningitis. Zeitschr. f. Hyg. 1915; S. 219.
- Gutzeit und Stern*, Trauma und epidemische Meningitis. Med. Klinik 1929; II, S. 1400.
- Hanke*, zitiert nach Aronowitsch. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde 1933; S. 72.
- Hasche-Klünder*, Der bakteriologische Befund bei Meningitis cerebrospp. und seine gerichtsärztliche Bedeutung. Deutsche Zeitschr. für Nervenheilk. 1909, Bd. 37; S. 466.
- Haslauer*, Zentralblatt f. Bakteriologie XIII 6, 7, 8; S. 633.
- Hitzler*, Ein Fall von traumatischer eitriger Meningitis. Diss. München 1911.
- Hofer*, Über traumatische Appendizitis. Diss. Berlin 1929.
- Kalb*, Über Meningokokkenmeningitis nach Schädeltrauma. Bruns' Beiträge zur klinischen Chirurgie 1921 S. 211.
- Kolle*, Handbuch der pathologischen Mikroorganismen. Aufl. 3. Bd. 4, II; S. 621.
- Korbsch*, Meningitis cerebrospp. epidemica. Archiv für Psychiatrie und Nervenheilk. Bd. 70/II; S. 221.
- Kutscher*, Über Untersuchungen der Nasenhöhle gesunder Menschen auf Meningokokken. D. Med. Woch. 1906 Nr. 27.
- Lenhartz*, XV. Kongreß für innere Med. in Berlin 1897. Münch. Med. Wochenschr. 1897 Nr. 26.
- Zur Behandlung der epid. Genickstarre. Münch. Med. Wochenschr. 1905 Nr. 12.
- Liß*, Ein Fall von traumatischer eitriger Meningitis ohne äußere Verletzung. Diss. Kiel 1900.
- Lode und Schmittermeier*, Ein Fall von Meningokokkenmeningitis nach Basissfraktur. Wiener Kl. Woch. 1929; S. 5.

- Lücke*, Deutsche Zeitschrift für Chirurgie Bd. 4.
- Markull*, Über Meningitis nach subcut. Verletzungen des Schädels und der Wirbelsäule. Diss. Leipzig 1914.
- Merkel*, Trauma und Meningitis. Münch. Med. Wochenchr. 1911; S. 1545.
- Michelsen*, Zum Krankheitsbild der Lentaform der Meningokokkensepsis. D. M. W. 1930 Nr. 25.
- Oppenheim*, Lehrbuch der Nervenkrankheiten. 7. Auflage 1923. S. 1164 und S. 1188.
- Oftermann*, die Meningokokkenpharyngitis als Grundlage der epidem. Genickstarre. D. M. W. 1906. 32 u. 11.
- Popp*, Über Trauma und Infektion in gegenseit. Beziehung und Berücksichtigung d. Spätmeningitis. Diss. München 1931.
- Raedeke*, Ärztliche Sachverständigenzeitung 1909.
- Reiche*, Berliner klinische Wochenchr. 1909. S. 1360.
— Der Typus der senilen Genickstarre. Mü. Med. Wochenchr. 1909.
- Reichard*, Einführung in die Unfall- und Invaliditätsbegutachtung
- Roefle*, zitiert nach Popp. Diss. München 1931. (siehe oben *Popp*).
- Schiff*, Schmidts Med. Jahrbücher 1899 Bd. 261 S. 11.
- Schmidt P.*, Pneumokokken- und Meningokokkenmeningitis nach Basisfraktur. D. M. W. 1916. II; S. 124.
- Schnitzler*, Beitrag zur Kenntnis der latenten Organismen. Ärztliche Sachverständigenzeitung 1900; S. 502.
- Schreiber u. Goldberg*, Ein Fall v. Meningokokkenmening nach Nasenkorrektur. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 63; S. 179.
- Simons*, Eitrige Meningitis. Diss. Bonn 1920.
- Smętkowski*, Zwei Fälle von Meningitis purulenta im Anschluß a. e. Comotio cerebri. Diss. Berlin 1927.
- Sonnenburg*, Appendizitis und ihr Zusammenhang mit Trauma.
- Spatz*, zitiert nach Spielmeyer. (siehe unten *Spielmeyer*).
- Spielmeyer*, Handbuch der Geisteskrankheiten von Bumke. Bd. 11; spezieller Teil VII S. 1—40.
- Sprengel*, Zur Frage der traumatischen Appendizitis. D. M. W. 1911. S. 2318.
- Steinthal*, Gibt es eine traumatische Appendizitis? Mü. Med. Wochenchr. 1927. S. 1660.
- Stern*, Über traumatische Entstehung innerer Krankheiten.
- Straßl*, Meningokokkenbakteriämie ohne meningitische Symptome. Diss. Hamburg 1932.
- Strümpell*, Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten. Bd. I 1930.
- Taschenberg*, zitiert nach Korbjch. Archiv für Psychiatrie und Nervenheilkunde Bd. 70. II S. 221.
- Torrance*, zitiert nach Aronowitsch. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde 1933.
- Weichselbaum*, Handbuch der pathologischen Mikroorganismen Bd. III; S. 392; 1903.
- Witschel*, Traumatische Meningitiden und ihre Behandlung. Diss. Berlin 1929.

Lebenslauf.

Am 24. Dezember 1908 wurde ich in Heidelberg als Sohn des Schutzmanns Johann Himmler geboren. Nach 3 $\frac{1}{2}$ jährigen Besuch der Volksschule kam ich auf das Progymnasium zu Rothenburg o. T., später besuchte ich das humanistische Gymnasium in Ansbach, wo ich 1928 das Zeugnis der Reife erhielt. Nach einem zwei Semester dauernden Studium der Mathematik und Physik in München wandte ich mich ebendort der medizinischen Ausbildung zu. Die ärztliche Vorprüfung bestand ich im Februar 1931. Die klinischen Semester verbrachte ich in Erlangen und legte dort im Frühjahr 1934 das ärztliche Staatsexamen ab. Nach einer 6 Monate langen Tätigkeit in der Heil- und Pflegeanstalt in Erlangen, bin ich nun als Medizinalpraktikant in der Frauenklinik zu Erlangen tätig
